

トリフルリジン・チピラシル 土 Bev療法(4週毎)

医薬品名	投与量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ベバシズマブ注	5mg/kg	30分 ^{*1}	↓																											
トリフルリジン・チピラシル錠	70mg/m ² /body	1日2回 ^{*2} 朝夕食後		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●															

* 1:初回90分、2回目60分、3回目以降30分へ短縮可能

■服用上の注意

治療スケジュールが複雑で、2種類の錠剤(15mg錠と20mg錠)を組み合わせて服用することもあるため、間違えて服用しないように注意が必要。

■副作用への対応

高血圧 ----- 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ベバシズマブ)

タンパク尿 ----- 定期的に尿検査を行う。(ベバシズマブ)

鼻血 ----- 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ベバシズマブ)

恶心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しづつでも食べる。水分を摂るようにする。

下痢 ----- 排便回数や便の性状を記録する。

口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回(8回/日以上)のうがいをする。

好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回(8回/日以上)に行う。特に3週目が低下しやすい。