

トラスツズマブ エムタンシン (T-DM1) (3週毎)

| 医薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-----------------|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| デキサメタゾン注 | 6.6mg | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トラスツズマブ エムタンシン注 | 3.6mg/kg | 30～90分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■副作用への対応

発熱、悪寒 (Infusion reaction) ----- 点滴中～投与後24時間以内に発現する。指示された解熱薬を使用する。(トラスツズマブ)

心機能低下 ----- 繰り返し点滴することにより労作時の呼吸困難、下肢浮腫、急激な体重増加などの症状が現れることがあるため、定期的に心エコー検査を行う。

血小板減少 ----- 出血しないよう注意する。鼻血や歯茎からの出血が止まらないときは病院に相談する。

悪心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。

口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回 (8回/日以上) のうがいをする。

好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回 (8回/日以上) に行う。

末梢神経障害 ----- 治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。