

CBDCA+PEM ± Bev療法（3週毎）

医薬品名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペバシズマブ注	15mg/kg	30分 ^{*1}	↓																				
デキサメタゾン注	6.6mg	30分	↓																				
パロノセトロン注	0.75mg																						
ペメトレキシド注	500mg/m ²	10分	↓																				
カルボプラチン注	AUC5	2時間	↓																				
ビタミンB12注 ^{*2}	1000 μg	9週毎	↓																				
デキサメタゾン錠	8mg/day	1日1回 朝食後		↓	↓																		
葉酸 ^{*3}	0.5mg/day	1日1回 朝食後	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

*1：初回90分、2回目60分、3回目以降30分へ短縮可能

*2：ペメトレキシド初回投与の少なくとも7日前に1回投与。その後9週毎に1回投与。

*3：ペメトレキシド投与7日以上前から投与中止後22日まで連日経口投与が必要

■副作用への対応

高血圧 ----- 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。（ペバシズマブ）

悪心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。

便秘 ----- 点滴後1週間は便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は使用する。

口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回（8回/日以上）のうがいをする。

好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回（8回/日以上）に行う。

■その他

NSAID s との併用でペメトレキシドの血中濃度が上昇する可能性があるため、NSAID s との併用を避ける。