

CBDCA+CPT-11療法（4週毎）

| 医薬品名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------|---------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| デキサメタゾン注 | 6.6mg | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パロノセトロン注 | 0.75mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサメタゾン注 | 6.6mg | 30分 | | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン注 | AUC5 | 1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イリノテカン注 | 60mg/m ² | 2時間 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

■副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 ----- 点滴後1週間は便が出にくくなることもあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は使用する。
- 下痢 ----- 点滴後24時間以内に発現する下痢と、24時間以降に遅発性に発現する下痢がある。排便記録をつけ6回/日以上の水様便の場合は病院へ連絡する。
- 口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回（8回/日以上）のうがいをする。
- 好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回（8回/日以上）に行う。
- 脱毛 ----- 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。