

nab-PTX ± Ram 療法（4週毎）

医薬品名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
d-クロルフェニラミン注 ^{*1}	10mg	30分	↓														↓													
ラムシルマブ注	8mg/kg	1時間 ^{*2}	↓														↓													
nab-パクリタキセル注	100mg/m ²	30分	↓							↓							↓													

*1：前立腺肥大症、緑内障の患者さんには、d-クロルフェニラミン注の代わりにエピナスチンやピラスチンを使用。

*2：速度は別途指示あり

■副作用への対応

- 高血圧 ----- 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。（ラムシルマブ）
- タンパク尿 ----- 定期的に尿検査を行う。（ラムシルマブ）
- 鼻血 ----- 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。（ラムシルマブ）
- 末梢神経障害 ----- 治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。（nab-パクリタキセル）
- 関節痛・筋肉痛 ----- 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うことがある。（nab-パクリタキセル）
- 悪心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回（8回/日以上）のうがいをする。
- 好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回（8回/日以上）に行う。
- 脱毛 ----- 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。