

FOLFIRI ± Pan療法（2週毎）

医薬品名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ注	6mg/kg	60分	↓													
デキサメタゾン注	6.6mg	30分	↓													
パロノセトロン注	0.75mg															
イリノテカン注	150mg/m ²	2時間*1	↓													
レボホリナート注	200mg/m ²	2時間*1	↓													
フルオロウラシル注	400mg/m ²	5分	↓													
フルオロウラシル注	2400mg/m ²	46時間	↓													

*1：同時に投与

■副作用への対応

- 皮膚乾燥 ----- 治療が進むにつれて乾燥と掻痒感が強くなる可能性があるため、開始と同時に市販薬の保湿剤を使用して保湿を開始する。（パニツムマブ）
- にきび様ざ瘡----- 顔や前胸部などに皮疹が出現するので、出現時には部位に応じたステロイド軟膏を保湿剤を塗布した上から塗布する。（パニツムマブ）
- 便秘 ----- 点滴後1週間は便が出にくくなる可能性があるため、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は使用する。
- 下痢 ----- 点滴後24時間以内に発現する下痢と、24時間以降に遅発性に発現する下痢がある。排便記録をつけ6回/日以上の水様便の場合は病院へ連絡する。
- 悪心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回（8回/日以上）のうがいをする。
- 好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅でも過ごす時も手洗い・うがいを頻回（8回/日以上）に行う。
- 電解質異常 ----- マグネシウムが低値になる可能性がある。（パニツムマブ）
- 脱毛 ----- 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。