

nab-PTX + GEM 療法(4週毎)

医薬品名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
nab-パクリタキセル注	125mg/㎡	30分	↓							↓						↓														
デキサメタゾン注	6.6mg										↓							↓												
グラニセトロン注	3mg																		↓											
ゲムシタビン注	1000mg/㎡	30分	↓							↓						↓														

■副作用への対応

末梢神経障害 ----- 治療を繰り返すことによって手足がしびれことがある。(nab-パクリタキセル)
 関節痛・筋肉痛 ----- 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることがある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うことがある。(nab-パクリタキセル)
 悪心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
 口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回(8回/日以上)のうがいをする。
 好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回(8回/日以上)に行う。
 脱毛 ----- 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウイッグを利用する。
 間質性肺疾患 ----- 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
 皮疹 ----- 点滴後に皮疹が出現することがある。症状に応じて薬を処方することがある。