

FOLFIRINOX療法(2週毎)

医薬品名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
デキサメタゾン注	6.6mg	30分	↓													
パロノセトロン注	0.75mg															
オキサリプラチン注	85mg/m ²	2時間	↓													
イリノテカン注	180mg/m ²	90分* ¹	↓													
レボホリナート注	200mg/m ²	2時間* ¹	↓													
フルオロウラシル注	400mg/m ²	5分	↓													
フルオロウラシル注	2400mg/m ²	46時間	↓													
アプレピタント		1日1回* ²	125 mg	80 mg	80 mg											

* 1: 同時に投与

* 2: 初日125mgは点滴開始60～90分前、2～3日目80mgは午前中に服用

■副作用への対応

- 末梢神経障害 ----- 冷感刺激を避けること(特に点滴後5日間程度)。(オキサリプラチン)
- 便秘 ----- 点滴後1週間は便が出にくくなるがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は使用する。
- 下痢 ----- 点滴後24時間以内に発現する下痢と、24時間以降に遅発性に発現する下痢がある。排便記録をつけ6回/日以上の水様便の場合は病院へ連絡する。
- 悪心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回(8回/日以上)のうがいをする。
- 好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回(8回/日以上)に行う。
- 脱毛 ----- 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。