

**CDDP + GEM 療法(3週毎)**

医薬品名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン注	6.6mg	30分	↓							↓													
グラニセトロン注	3mg																						
シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	2時間	↓							↓													
ゲムシタビン注	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	↓							↓													

■副作用への対応

- 腎機能障害 ----- 予防のために点滴当日から3日間は1L/日の飲水が必要。(シスプラチン)
- 悪心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回(8回/日以上)のうがいをする。
- 好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回(8回/日以上)に行う。
- 間質性肺疾患 ----- 息切れ、息苦しさ、空咳、発熱の症状が現れた場合、速やかに病院に連絡する。
- 皮疹 ----- 点滴後に皮疹が出現することがある。症状に応じて薬を処方することがある。