

S-1 療法（6週毎or3週毎）

4週服用/2週休薬(6週毎)の場合

医薬品名	投与量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	~	29	30	31	~	41	42
S-1	80mg/m ²	1日2回 朝夕食後	↓ 夕*	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓ 朝			~		

* 1: day2の朝~day29夕までの内服でも可能

2週服用/1週休薬(3週毎)の場合

医薬品名	投与量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1	80mg/m ²	1日2回 朝夕食後	↓ 夕*	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓ 朝						

* 2: day2の朝~day15夕までの内服でも可能

■副作用への対応

- 悪心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 下痢 ----- 排便回数や便の性状を記録する。
- 口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回(8回/日以上)のうがいをする。
- 手足症候群 ----- 予防のために保湿剤を1日2回以上塗布。市販のハンドクリームや保湿剤で可。
- 好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅でも手洗い・うがいを頻回(8回/日以上)に行う。
- 流涙 ----- 防腐剤を含まない人工涙液を5~6回/日点眼する。