

DTX療法(3週毎)

医薬品名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン注	6.6mg	30分	↓																				
ドセタキセル注	70mg/ m ²	2時間	↓																				
デキサメタゾン錠	8mg/day	1日2回 朝昼食後		↓	↓																		

* :ステロイド併用(患者の状態に応じて使用しないこともある)

■副作用への対応

- 恶心嘔吐、食欲不振 ----- 食事を摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しづつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 味覚変化 ----- 味覚変化のために食事を摂りづらい時は、味付けなどを工夫しながら食べる。
- 口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回(8回/日以上)のうがいをする。
- 好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回(8回/日以上)に行う。
- 関節痛・筋肉痛 ----- 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることがある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うことがある。
- 爪の変形 ----- 繰り返し点滴することにより爪の変形や変色が起こることがある。清潔に保ち、強い力をかけないようにする。
- 脱毛 ----- 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウイッグを利用する。

■その他

- 発熱性好中球減少症の発症抑制のためにペグフィルグラストムを使用することもある。