

CBDCA+PTX ± Bev療法(3週毎)

(2泊3日入院)

医薬品名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ベバシズマブ注	15mg/kg	30分* ¹	↓																					
デキサメタゾン注	16.5mg	30分	↓																					
ファモチジン注	20mg																							
d-クロルフェニラミン注* ²	10mg																							
パロノセトロン注	0.75mg	30分	↓																					
パクリタキセル	175mg/m ²	3時間以上	↓																					
カルボプラチン注	AUC5	1時間	↓																					
アプレピタント		1日1回* ³	125 mg	80 mg	80 mg																			

* 1: 初回90分、2回目60分、3回目以降30分へ短縮可能

* 2: 緑内障の患者さんには、d-クロルフェニラミン注の代わりにエピナスチンを使用。

* 3: 初日125mgは点滴開始60～90分前、2～3日目80mgは午前中に服用

■副作用への対応

- 高血圧 ----- 血圧が上昇する可能性があるため家庭血圧を記録する。(ベバシズマブ)
- タンパク尿 ----- 定期的に尿検査を行う。(ベバシズマブ)
- 鼻血 ----- 強く鼻をかんだり触ったりしない。鼻血はほとんどの場合は軽度で、安静にしていれば止まる。(ベバシズマブ)
- 悪心嘔吐、食欲不振 ----- 食事が摂りづらい時は、食べられるもの、好きなものを少しずつでも食べる。水分を摂るようにする。
- 便秘 ----- 点滴後1週間は便が出にくくなることがあるので、排便記録をつける。便秘薬が処方されている場合は使用する。
- 口内炎 ----- 予防のために食後の歯磨き、頻回(8回/日以上)のうがいをする。
- 好中球減少 ----- 感染症予防のために、外出後だけでなく自宅で過ごす時も手洗い・うがいを頻回(8回/日以上)に行う。
- 末梢神経障害 ----- 治療を繰り返すことによって手足がしびれることがある。
- 関節痛・筋肉痛 ----- 点滴後、関節痛や筋肉痛を感じることもある。痛みが強い場合は鎮痛剤を使うことがある。
- 脱毛 ----- 点滴後、早ければ2週間程度で髪の毛が抜け始める。帽子やウィッグを利用する。